

# Des brebis en bonne santé sur les surfaces céréalières

*LAURENCE SAGOT et SOPHIE LAVIGNE – IDELE / CIIRPO*



# 1256 brebis suivies

- Huit séries de mesures liées au bien-être animal,
- 1256 brebis,
- en début et fin de séquence de pâturage,
- Romane, Île-de-France, Wayrere-Romney, Solognote et Limousine.



# Des besoins alimentaires couverts


- **Couverts végétaux** : 0,9 UFL et 90 g de PDI par kg de matière sèche
- **Céréale au stade tallage** : 1 UFL et 100 g de PDI par kg de matière sèche





# Des besoins alimentaires couverts

## Augmentation des brebis en bon état de 8%



# La laine en guise d'imperméable


**Une peau sèche quelles que soient les conditions météorologiques**

NOMBRE DE BREBIS	HUMIDITÉ EXTÉRIEURE (% ANIMAUX SECS)		HUMIDITÉ DE LA LAINE CÔTÉ PEAU (% ANIMAUX SECS)	
	Début de pâturage	Fin de pâturage	Début de pâturage	Fin de pâturage
1256	40 %	58%	99,3%	100 %

Source : POSCIF/CIIRPO 2021

# Des animaux propres sur toutes les faces

**Membres, mamelles, flancs, arrière-train :  
pas de problème de salissure**



# Peu de boiteries

## Une faible proportion de boiteries

Proportion de brebis sans boiterie

ÉLEVAGE	AUTOMNE/HIVER DE SUIVI	NOMBRE DE BREBIS	DÉBUT DE PÂTURAGE % SANS BOITERIE	FIN DE PÂTURAGE	
				% SANS BOITERIE	PRÉSENTANT UNE FORTE BOITERIE
1	2019/2020	78	100 %	96,2 %	1 brebis
2	2018/2019	120	100 %	100 %	-
2	2019/2020	157	97,8 %	100 %	-
3	2018/2019	222	99,5 %	100 %	-
3	2019/2020	249	100 %	100 %	-
4	2019/2020	117	99,1 %	100 %	-
5	2019/2020	60	100 %	88,3 %	1 brebis
6	2019/2020	253	100 %	100 %	-
TOTAL		1256	99,7 %	99,2 %	0,2 %

Source : POSCIF/CIRPO 2021



# Sans problème respiratoire

## Des brebis adaptées au grand air

Proportion de brebis sans problème respiratoire ou oculaire

Durée moyenne de pâturage 70 jours (29 j- 97 j)		
	Début de pâturage	Fin de pâturage
Nombre de brebis	1256	1256
Toux	99,4 %	95,6 %
Respiration entravée	99,7 %	99,8 %
Écoulements nasaux	66 %	55 %
Écoulement oculaires	100 %	100 %

Source : POSCIF/CIIRPO 2021



# Les points de vigilance

- les espèces fourragères **toxiques** : les moutardes en pure, la gesse et la vesce velue si elles sont en graines, le sarrasin en pur,
- pour les **céréales** : une pierre de sel enrichie pour prévenir les hypocalcémies.

